

BLS – odmienności

noworodki, niemowlęta, dzieci, kobiety w widocznej ciąży

Wyjaśnijmy kilka pojęć:

- noworodek – od urodzenia do 30 dnia życia
- niemowlę – od 1 miesiąca do 12 miesiąca życia
- dziecko – od 1 roku do okresu pokwitania (nie jest określony czasem)

Noworodek – odmienności w RKO

1. 5 oddechów ratowniczych,
2. uciśnięcia klatki piersiowej na przemian z oddechami ratowniczymi w stosunku 3:1
 - Uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami
 - Oddechy ratownicze – usta-usta-nos

Niemowlę – odmienności w RKO

1. 5 oddechów ratowniczych
2. uciśnięcia klatki piersiowej na przemian z oddechami ratowniczymi w stosunku 15:2
 - Uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami
 - Oddechy ratownicze – usta-usta-nos

Dziecko – odmienności w RKO

1. 5 oddechów ratowniczych,
 2. uciśnięcia klatki piersiowej na przemian z oddechami ratowniczymi w stosunku 15:2
- Uciskanie klatki piersiowej dwoma rękoma lub jedną

Kobiety w widocznej ciąży – odmienności w RKO

- Resuscytacja według algorytmu BLS dla dorosłych w pozycji na wznak z uniesionym prawym biodrem lub przesunięciem brzucha w lewą stronę.
- Rozważyć ułożenie dłoni nieco wyżej na klatce piersiowej poszkodowanej.

Zbierz wszystkie informacje w jeden schemat. Zamieść go w zeszycie pod tematem dzisiejszej lekcji.

